

Cuándo mantener a su niño en casa

Estimado padre/madre o tutor legal:

Mantenga a su niño en casa en los siguientes casos:

- Este se encuentra muy enfermo para participar en las actividades normales.
- Necesita un nivel de atención u observación que la escuela o guardería no puede brindar.
- Crea un entorno poco saludable o seguro para los demás.

Debe mantener a su niño en casa si padece algunas afecciones. Estas incluyen, entre otras, las siguientes:

Varicela	Mantenga a su niño en casa hasta que todas las ampollas tengan costra y no se formen ampollas nuevas.
Diarrea	Mantenga a su niño en casa: <ul style="list-style-type: none">• sin ir a la escuela hasta que pueda contener la diarrea y pueda participar en las actividades normales.• sin ir a la guardería hasta que haya tenido menos de tres episodios de diarrea durante las últimas 24 horas.
Fiebre	Mantenga a su niño en casa hasta que tenga una temperatura inferior a 38,0 °C (100,4 °F) y no tenga cambios de conducta, dolor de garganta, erupción cutánea, vómitos, diarrea, dolor de oído, irritabilidad o confusión.
Gripe (influenza)	Mantenga a su niño en casa hasta que no tenga fiebre durante 24 horas.
Impétigo	Mantenga a su niño en casa hasta que haya tomado antibióticos durante 24 horas.
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM)	Mantenga a su niño en casa hasta que el drenaje pueda contenerse con un vendaje seco y limpio.
Sarampión	Mantenga a su niño en casa hasta cinco días después de que aparezca la erupción cutánea.
Paperas	Mantenga a su niño en casa hasta cinco días después de que comience la hinchazón.
Tiña	Mantenga a su niño en casa hasta que se inicie el tratamiento.
Escabiosis	Mantenga a su niño en casa hasta que finalice el tratamiento.
Fiebre escarlata	Mantenga a su niño en casa hasta que haya tomado antibióticos durante 24 horas y no tenga fiebre.
Herpes	Mantenga a su niño en casa hasta que la erupción cutánea pueda cubrirse o cuando todas las lesiones tengan costra.
Infecciones de la piel	Mantenga a su niño en casa hasta que el drenaje pueda contenerse con un vendaje seco y limpio.
Amigdalitis estreptocócica	Mantenga a su niño en casa hasta que haya tomado antibióticos durante 24 horas y no tenga fiebre.
Vómitos	Mantenga a su niño en casa hasta que no haya vomitado durante 24 horas y pueda participar en actividades normales.
Tos convulsa (tos ferina)	Mantenga a su niño en casa hasta que haya tomado antibióticos durante un total de cinco días.
Otras afecciones contagiosas	Consulte con la escuela, la guardería o el proveedor de atención primaria de su niño, o llame al Departamento de Salud al (253) 798-6410.

No es necesario que mantenga a su niño en casa (a menos que esté muy enfermo para participar en las actividades normales) si padece las siguientes afecciones.

- Bronquitis
- Resfriado (sin fiebre)
- Citomegalovirus (CMV)
- Infección de oído
- Quinta enfermedad
- Exantema vírico de manos, pies y boca
- Molusco contagioso
- Mononucleosis
- Lombriz intestinal
- Neumonía
- Virus sincicial respiratorio (VSR)
- Verrugas

El Departamento de Salud, los proveedores de atención primaria, las escuelas o las guarderías pueden hacer excepciones a estos requisitos de exclusión según el caso.